








































Genre suprême

GENTIANA



JOSEPHI PITTON
TOURNEFORT
AQUISEXTIENSIS,

Doct̃oris Medici Parisiensis, Academiae Regiae Scientiarum Socii,
& in Horto Regio Botanices Professoris,

INSTITUTIONES
REI
HERBARIÆ.


EDITIO ALTERA, GALLICA LONGE AUCTION,
quingentis circiter Tabulis aeneis adornata.

TOMUS PRIMUS.



PARISIIS,
E TYPOGRAPHIA REGIA.

M. DCC.







1. LE GREBE CORNU. 2. LE CASTAGNEUX.

HISTOIRE NATURELLE DES OISEAUX.

XL^e GENRE.

LE GREBE, *COLYMBUS*.


(Bec non dentelé.)

Caractère générique : bec subulé, un peu comprimé sur les côtés.


LE GREBE.

Première espèce.

Le grèbe est bien connu par ces beaux manchons d'un blanc argenté qui ont, avec la molleuse épaisseur du duvet, Oiseaux. VIII.







VOYAGE
DANS
LA BASSE ET LA HAUTE
ÉGYPTE,

PENDANT
LES CAMPAGNES DU GÉNÉRAL BONAPARTE

PAR VIVANT DENON,

MEMBRE DE L'INSTITUT NATIONAL DE FRANCE; DE CELUI
DE BOLOGNE; DES ACADÉMIES DES ARTS DE FLORENCE ET
DE VENISE; DIRECTEUR GÉNÉRAL DU MUSÉE CENTRAL DES
ARTS, DE LA MONNOIE DES MÉDAILLES, etc, etc.

QUATRIÈME ÉDITION.

TOME PREMIER.




A PARIS,
DE L'IMPRIMERIE DE P. DIDOT L'AÎNÉ,
AUX GALERIES DU LOUVRE, n° 3.

AN XI. = M. DCCCXI.

P. Didot



Né en 1707, Carl von Linné meurt à Uppsala en 1778, la même année que Jean-Jacques Rousseau.



CAROLI LINNÆI
Doct. Med. & Acad. Imp. Nat. Cur. Soc.
F L O R A
L A P P O N I C A

Exhibens
P L A N T A S
Per
L A P P O N I A M

*Crescentes, secundum Systema Sexuale
Collectas in Itinere*

Impensis
SOC. REG. LITTER. ET SCIENT. SVECIÆ
A. MDCCXXXII.

Instituto.

Additis

Synonymis, & Locis Natalibus Omnium,
Descriptionibus & Figuris Rariorum,
Viribus Medicatis & Oeconomicis
Plurimarum.



HERBIER

Famille des LAMIACEES

Nom scientifique: *Glechoma hederacea* L.

Nom français: Lierre terrestre

Nom vulgaires:

Lieu de récolte: *Ch. Plabizet*

Date de récolte: *3 Avril 77*

Station: *Pâtis marécageux (C)*

Nature du terrain: *Calcaire*

Localité: *St. Omer - Les - Gues*

Propriétés et usages:





Deuxieme Tableau du Systeme Sexuel de Linné.


Andrie. Classe 13. 	Dydynamie. Cl. 14. 	Tetradynamie. Cl. 15. 
Adelphie. Cl. 16. 	Diadelphie. Cl. 17. 	Polyadelphie. Cl. 18. 
Angesie. Cl. 19. 	Gynandrie. Cl. 20. 	Monoecie. Cl. 21. 
oecie. Cl. 22. 	Polygamie. Cl. 23. 	Cryptogamie. Cl. 24. 

L'exemple des canidés

Pour chaque espèce, on trouve des éléments à comparer : ces animaux ont-ils un squelette ? Allaitent-ils leur petits ?, etc.



Puis, on classe les animaux dans des catégories qui s'emboîtent les unes dans les autres, comme des tiroirs.



À la fin, on sait que le chien est canidé faisant aussi partie carnivores, des mammifères, vertébrés et des bilatériens. Ouf !
























Lamarck believed that animals adapted through 'Use' and 'Disuse.'




By straining their necks to reach the leaves, the giraffes 'used' their necks, causing them to elongate




The giraffes were then able to reach the leaves on the high branches



Darwin believed that certain giraffes had been randomly born with a genetic mutation causing a longer neck



A longer neck was advantageous, making the giraffe more likely to survive and therefore reproduce, passing on the gene



Over time, only the long-necked giraffes remain










fig. 3 L'endosymbiose est le processus par lequel une cellule photosynthétique est incorporée à l'intérieur d'une autre et devient un plaste, c'est-à-dire un organe

d'un plaste (**b**, on parle d'endosymbiose secondaire). Les hétérocontes et les euglénophytes sont apparus de cette façon. Enfin, dans le cas d'une endosymbiose








Bactéries



Archées



Eucaryotes



Luca

